

TREŚĆ OZNAKOWANIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO

BIFENT[®]FOGGER PLUS

Preparat do użytku profesjonalnego.

Preparat owadobójczy w formie aerozolu ULV przeznaczony do zwalczania owadów biegających (karaczany) oraz latających (muchy, komary) wewnątrz budynków, w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, zakładach przemysłu spożywczego, restauracjach, sklepach, miejscach użyteczności publicznej.

SUBSTANCJE CZYNNNE:

1. 5-[[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]metylo]-6-propylo-1,3-benzodioksol (Butotlenek piperonylu), CAS: 51-03-6.....187,5 g/l
2. 3-fenoksybenzylo (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (permetryna), CAS: 52645-53-1.....125 g/l
3. Tetrametryna, CAS: 7696-12-0.....50 g/l

POSTAĆ PRODUKTU: aerozol

ZAKRES STOSOWANIA:

Owady biegające takie jak karaczany oraz owady latające takiej jak muchy i komary.

ZALECANE STĘŻENIA I DAWKI

Opakowanie 200 g skutecznie działa w objętości 1000m³

1 sekunda aplikacji uwalnia 1,7 g produktu skutecznego w objętości 8,3 m³. Obliczyć kubaturę pomieszczenia oraz czas aplikacji dla zastosowania minimalnej skutecznej dawki produktu.

Np. dla pomieszczenia 5m x 5m x 2,5 m o kubaturze 62,5 m³ wystarczająca jest aplikacja produktu przez 7,5 sekundy.

Produkt zaczyna działać po 5 minutach po aplikacji i pełną skuteczność osiąga po 24 h.

SPOSÓB UŻYCIA

Wewnątrz pomieszczeń.

Przed wykonaniem zabiegu należy usunąć z pomieszczenia ludzi, zwierzęta, akwaria, naczynia kuchenne i stołowe, żywność oraz nakryć powierzchnie służące do jej przechowywania itp.; zabezpieczyć przed skażeniem wodę pitną. Pomieszczenie należy zamknąć, w przypadku pomieszczeń klimatyzowanych należy wyłączyć klimatyzację. Wyłączyć urządzenia elektryczne oraz usunąć źródła otwartego ognia.

Aerozol należy umieścić na podłodze w centralnej części pomieszczenia. Pod pojemnikiem umieścić karton lub gazetę. Nie należy stawiać pojemnika bezpośrednio na ziemi. Nie stosować preparatu wewnątrz szaf, pod meblami (np. pod stołem) etc. **NIE PALIĆ!**

Aktywacja aerozolu:

1. Odsunąć pojemnik na długość ramienia z dyszą skierowaną w kierunku przeciwnym do twarzy (preparat jest uwalniany z dyszy pionowo ku górze).
2. Nacisnąć delikatnie aktywator i przytrzymać aplikując preparat na małych powierzchniach przez czas wymagany dla uwolnienia odpowiedniej dawki, następnie opuścić pomieszczenie.
3. W przypadku „pełnej dawki” nacisnąć aktywator zdecydowanie do pozycji zablokowanej. Trzymając pojemnik z dala od twarzy ustawić pojemnik w pozycji pionowej i opuścić pomieszczenie, w którym zabieg jest przeprowadzany.

4. Pozostawić pomieszczenie wolne przez ok. 4 godziny. Po tym czasie, otworzyć drzwi oraz okna i wietrzyć pomieszczenie przez ok. 1 godzinę.

Środki ostrożności przy postępowaniu z produktem: Przechowywać z dala od wysokich temperatur, źródeł zapłonu i otwartego ognia.

BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UBOCZNE SKUTKI STOSOWANIA

Ostre objawy – produkt może wywołać miejscowe podrażnienie spojówek i ich zaczerwienienie, łzawienie

Opóźnione objawy – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

PIERWSZA POMOC

Skażenie skóry: Zdjąć całą skażoną odzież. Obmyć skórę wodą, a następnie wodą i mydłem. Jeżeli wystąpią utrzymujące się objawy podrażnienia bądź uczulenia skontaktować się z lekarzem. Skażoną odzież należy uprać przed ponownym założeniem.

Skażenie oczu: Przemycać odpowiednim płynem do przemywania oczu lub czystą wodą, utrzymując powieki otwarte przez co najmniej 10 minut, zasięgnąć porady lekarza.

Narażenie inhalacyjne: Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji, przy trudnościach z oddychaniem zapewnić świeże powietrze i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Spożycie: Dokładnie wypłukać usta wodą (nie podawać do picia mleka, oleju ani alkoholu), natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku pogorszenia stanu zdrowia. **UWAGA!** Tłuszcze, oleje jadalne oraz alkohol mogą zwiększać wchłanianie substancji czynnej.

POSTĘPOWANIE I PRZECHOWYWANIE

UWAGA! Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 50°C. Nie przekłuwać i nie palić nawet po opróżnieniu. Nie palić papierosów. Nie rozpylać na źródło otwartego ognia lub na inne rozgrzane materiały. Nie przekłuwać i nie wrzucać pojemnika do ognia – nawet po zużyciu. Zawiera 60% wagowych wysoce łatwopalnych gazów. Przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu niedostępnym dla dzieci.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

PREPARAT/ OPAKOWANIE: Przekazać do utylizacji w zakładzie posiadającym zezwolenie w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (odpad niebezpieczny).

NUMER POZWOLENIA NA OBRÓT PRODUKTEM BIOBÓJCZYM:

NR SERII:

DATA PRODUKCJI

DATA WAŻNOŚCI: 3 lata od daty produkcji

ILOŚĆ:

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawna
Ul. Moździerzowców 6a
43-602 Jaworzno
+48 32 745 47 00

Oznakowanie CLP

Zawiera: Butolienek piperonylu, permetryna, tetrametryna, izobutan



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty określające rodzaj zagrożenia:

Skrajnie łatwopalny aerosol

Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

Może powodować reakcję alergiczną skóry

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany

Zwroty określające środki ostrożności:

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Unikać wdychania mgły

Unikać uwolnienia do środowiska

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną

Zebrać wyciek

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C

.....
PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ