

Profesjonalna ochrona przed muchami z **Seclira® Fly Bait**

Pierwszym krokiem w każdym programie ochrony przed muchami jest dokładna inspekcja zagrożonego pomieszczenia oraz zwiększenie środków higieny. Następnie należy skupić się na kontroli populacji. **Seclira® Fly Bait** doskonale nadaje się zarówno do zastosowań domowych, komercyjnych i rolniczych, a przy odpowiednim użyciu pozwala wyjątkowo skutecznie zwalczać uciążliwe gatunki much.



Zabezpiecza do
400 m²
budynku



Zabezpiecza do
200 m²
budynku

- Proste i precyzyjne stosowanie
- Bezbarwna i bezzapachowa formułacja
- Wygodna i szybka aplikacja
- Szybkie działanie i długotrwała skuteczność



Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.pestcontrol.basf.pl

BASF Polska
Professional & Specialty Solutions
Aleje Jerozolimskie 142b, 02-305
Warszawa, Polska
pestinfo@basf.com

Korzystaj z produktów biobójczych w bezpieczny sposób. Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed jego zastosowaniem. Seclira® zawiera dinotefuran. Seclira® jest zarejestrowanym znakiem towarowym BASF.
© 2022 Prawa autorskie BASF. Wszelkie prawa zastrzeżone.



BASF
We create chemistry

Seclira® Fly Bait Twój sposób na muchy

- Skuteczne i szybkie działanie
- Wydajne rozwiązanie
- Długotrwały efekt
- Gotowy do użycia



Wyzwania w zwalczaniu much

Walka z muchami w środowiskach komercyjnych, rolniczych i domowych może być bardzo trudna. Dużo much pojawia się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, szczególnie w obszarach wrażliwych, takich jak kuchnie i bary. Odpowiednia higiena w obu miejscach jest niezbędna do utrzymania kontroli nad populacją much.



Seclira® Fly Bait


jest pierwszym, gotowym do użycia rozwiązaniem wabiącym i zwalczającym muchy w formie areozolu.

Spraw aby zwalczanie much dzięki Seclira® Fly Bait było niewidoczne dla klientów:

- **Bezbarwna i bezzapachowa przynęta**

Muchy zostają odurzone w ciągu sekund lub minut od kontaktu lub spożycia.

Liczba odurzonych sztuk i śmiertelność muchy domowej (*Musca domestica*) 42 dni po zastosowaniu środka



— Seclira® Fly Bait — Przynęta z imidakloprydem
— Przynęta z tiametoksamem — Przynęta z klotianidyną

Zalecenia stosowania



Ciepłe powierzchnie ścian



Wejście: wokół drzwi



Wokół okien



Pod i za barem, butlami i beczkami na napoje



W pobliżu źródeł światła



Okolice okapów



Pojemniki na śmieci i pokrywy



Kosze na śmieci



Tablice do aplikacji



Instalacje przeciwpożarowe / natryskowe

Substancja aktywna
Dinotefuran 0,5%

Zastosowanie

Wewnątrz: w obiektach handlowych, przemysłowych i mieszkalnych, w miejscach, gdzie przetwarzana jest żywność oraz w budynkach inwentarskich.

Gatunki docelowe
Muchy

Kategoria użytkownika
Użytkownik profesjonalny

Sposób stosowania

Natrysk pasmowy lub punktowy można dostosować do specyfiki danego obiektu.

Natrysk pasmowy na istniejących powierzchniach nieporowatych

Rozpylać przez 3 sekundy na metr bieżący w odległości 30 cm od powierzchni



Stosowane dawki

- Metoda: natrysk
- Nanieść 16 g produktu na m², co jest równe natryskiwaniu przez 3 sekundy na metr bieżący przy natryskiwaniu pasmowym

- 500 ml produktu wystarcza do ochrony 400 m² powierzchni budynku 11 razy w roku (w przypadku budynków inwentarskich nie częściej niż 6 razy)
- Wchodzić ponownie dopiero po wyschnięciu produktu

Środek można stosować w pomieszczeniach gastronomicznych, ale należy upewnić się, że żywność, która jest przygotowywana, spożywana lub przechowywana, nie ma bezpośredniego kontaktu ze spryskanymi powierzchniami.

Podczas inspekcji kluczowe jest określenie obszarów, w których muchy żerują i odpoczywają, a następnie przeprowadzenie odpowiedniego zabiegu. Muchy pozostawiają na tych powierzchniach plamy (odchody), więc obszary, na których zauważono plamy, powinny zostać spryskane preparatem.